



Reserva de sedación para _____ fecha _____

Mediante una decisión mutua entre usted y el dentista de su hijo, el método de tratamiento apropiado para abordar las necesidades de su hijo de manera segura y efectiva es realizar el tratamiento necesario en el consultorio usando sedación consciente. Lo siguiente es importante con respecto a la cita de sedación de su hijo:

Por favor lea cada declaración cuidadosamente, luego ponga sus iniciales en cada declaración. Si usted no entiende, por favor pida una aclaración antes de iniciar. Debe firmar el consentimiento el día de la cita.

| | | INICIALES DEL PADRE O TUTOR |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| ANTES DE LA CITA | PAUTAS NPO: No permita que su hijo coma o beba nada después de la medianoche antes de la cita. Si el tratamiento no puede ser completado según lo programado debido a que el paciente no cumplió con las pautas se hará un cargo de \$200. Este cargo cubre la programación limitada que tenemos para nuestras citas de sedación. | |
| EFFECTOS DE LA SEDACIÓN | Su hijo no va a estar bajo anestesia general. Nuestro propósito es sedar a su hijo con Valium, Demerol y/o Versed. Estos medicamentos van a ayudar a su hijo a relajarse y a estar concentrado en la televisión como distracción. En ocasiones, el paciente se puede dormir. Mientras está sedado, los signos vitales de su hijo serán monitoreados igual que en una sala de operación. Probablemente su hijo siga llorando pero tenga por seguro que estará lo más cómodo posible. | |
| RESTRICCIONES | Como parte de la sedación, podemos hacer restricciones como que un asistente dental ayude a sostener las manos y pies de su hijo. El asistente está capacitado para brindar comodidad y a la vez proteger a su hijo. Tal vez podría usarse una camilla de inmovilización para prevenir movimientos peligrosos como rodar de la silla durante el tratamiento. (Se requiere un consentimiento adicional para dicho tablero de inmovilización) | |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| <p>ALOJAMIENTO EN LA HABITACIÓN</p> | <p>Los niños escuchan y responden mejor cuando ellos confían en las capacidades de su dentista sin influencias externas. Los niños perciben sus ansiedades; generalmente hablando, es mejor que los padres permanezcan en la sala de recepción hasta que el tratamiento sea completado. Esto también es para que su hijo nos dedique el 100% de su atención mientras esta sedado.</p> | |
|-------------------------------------|---|--|

INSTRUCCIONES PARA PACIENTES QUE RECIBEN SEDACIÓN PARA UN TRATAMIENTO DENTAL

| | | |
|----------------------------|---|--|
| <p>COMIDAS Y BEBIDAS</p> | <p>Para que no vomite y tenga complicaciones durante el tratamiento con sedación y la anestesia, NO le de nada de comida o bebida (además de agua) después de la media noche antes de su cita, a menos que su médico le indique lo contrario.</p> | |
| <p>CAMBIOS EN LA SALUD</p> | <p>Informe a este consultorio antes de su cita, cualquier cambio en la salud de su hijo. Es muy importante cualquier cambio, especialmente el desarrollo de algún resfriado o fiebre durante los 7 días antes del día del tratamiento. Para la seguridad del niño podría hacerse una nueva cita para otro día.</p> | |
| <p>MEDICAMENTO</p> | <p>Administre a su hijo sólo aquellos medicamentos que su hijo toma rutinariamente, como medicamento para convulsiones, profilaxis antibiótica o alguno que su doctor le haya recetado tomar de forma rutinaria.</p> | |
| <p>AL LLEGAR</p> | <p>El padre o tutor legal debe acompañar al paciente al consultorio y debe estar ahí hasta que el tratamiento sea completado. Una vez que lleguen, se pesara a su hijo y se medicara. Usted y su hijo van a estar cómodos mientras la medicación hace efecto. Usted tendrá que estar cerca de su hijo para monitorearlo durante ese tiempo para revisar los signos de cualquier cambio como malestar estomacal, sarpullido, somnolencia extrema o problemas respiratorios. El objetivo es mantener a su hijo lo más inmóvil posible mientras ve películas y/o lee un libro. Durante este tiempo, infórmenos de inmediato si el o ella tiene algún cambio</p> <p>(malestar estomacal, sarpullido, somnolencia extrema o problemas para respirar)</p> | |



| | | |
|--|--|--|
| LLEGANDO A CASA | El paciente debe de estar acompañado por un adulto responsable todo el tiempo. Alguien mas que no sea el paciente debe de estar disponible para llevarlo a casa. Se debe monitorear a su hijo de cerca para detectar cualquier signo de dificultad para respirar y asegurarlo cuidadosamente en su asiento de carro o sujetarlo con el cinturón durante su transportación. NO use el autobús para transportarse a casa. | |
| BEBIDAS Y COMIDAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | Después del tratamiento, la primera bebida debe ser básicamente agua. Después, puede tratar con bebidas dulces, jugos o gatorade. Es preferible pequeños sorbos repetidamente que tragos largos. Comida blanda, no muy caliente, puede tomarla cada vez que el niño lo quiera. | |
| ENTUMECIMIENTO DE MEJILLAS, LABIOS Y ENCÍA. | Las mejillas, labios y encía de su hijo van a estar entumecidos después del tratamiento. Revise que sea cuidadoso varias horas para asegurarse que el/ella no se muerda sus mejillas, labios o lengua. | |
| ACTIVIDAD | NO planee actividades el día del tratamiento. Deje al niño descansar. Supervise a su hijo de cerca por el resto del día. | |
| ELEVACIÓN DE TEMPERATURA | La temperatura de su hijo puede elevarse a 101°F durante las primeras 24 horas después del tratamiento. El acetaminofén (Tylenol) cada 4 a 6 horas y los líquidos ayudarán a aliviar esta condición. Si la temperatura de su hijo sube alrededor de 101°F, llame a nuestra oficina inmediatamente. | |
| LLAME Englewood: 303-779-5306 Central Park: 303-399-5437 Thornton: 720-629-9969 | <ul style="list-style-type: none"> - Los vómitos duran más de 4 horas - La temperatura permanece elevada por más de 24 horas o está por encima de los 101 °F - Su hijo tiene dificultad para respirar - Otro asunto que le preocupe | |



Medicamentos: _____

-Recetas: _____

-Medicaciones sin receta: _____

Alergias a medicamentos, medicaciones u otros: _____

Conmociones cerebrales (actuales): _____ Pasadas: _____

Asma: _____

Tuberculosis: _____

Neumonía/Enfermedad pulmonar: _____

Hepatitis/Enfermedad gastrointestinal del hígado: _____

Enfermedad del riñón: _____

Fiebre reumática: _____

Enfermedad por calor: _____

Diabetes: _____

Hospitalización (explicar): _____

Profilaxis requerida para procedimientos dentales:

- Válvula cardíaca protésica o material protésico utilizado para la reparación de válvulas cardíacas.
- Endocarditis infecciosa previa
- Enfermedad auditiva congénita (CHD)
 - CHD cianótico no reparado, incluidos conductos y cierres paliativos.
 - Defecto cardíaco congénito completamente reparado con material o dispositivo prostático, colocado por cirugía o por catéter, intervención, durante los primeros 6 meses después del procedimiento.
 - reparación CDH con defectos residuales en el sitio o adyacente al sitio de un parche protésico o prótesis dispositivo (que inhibe la endotelización).
 - Receptores de trasplante cardíaco que desarrollan valvulopatía cardíaca.

Parent/ Guardian Signature: _____ Date: _____

SEDACIÓN CONSCIENTE

Se ha recomendado que el tratamiento dental de su hijo se complete con el uso de sedación oral consciente con medicamento. Usted y el médico han elegido la sedación oral consciente como alternativa a:

- 1) Sin tratamiento
- 2) Tratamiento en el hospital con el uso de anestesia general

Debido a los arreglos especiales que se requieren para este procedimiento, es importante que revise el siguiente el material adjunto a fondo en él encontrará la instrucción preoperatoria, la instrucción postoperatoria y la información de formularios de consentimiento. Es importante que lea estos documentos en su totalidad antes de firmarlos y los lleve con usted a la cita programada.

Deberá llegar a tiempo a la cita, planea llegar 10-15 minutos antes de la hora programada.

Hora de la cita: En este momento le administramos el medicamento a su hijo, asegurándonos de que el médico y miembros del personal especialmente capacitados pueden monitorear a su hijo una vez que se ha tomado el medicamento. Es importante que usted notifique a la oficina inmediatamente si su hijo se enferma antes de la cita. El médico evaluará la situación y determinará si será necesario reprogramar la cita o no.

NO LE DÉ A SU HIJO NINGÚN MEDICAMENTO EN CASA DENTRO DE LAS 24 HORAS A MENOS QUE SE HAYA DISCUTIDO PREVIAMENTE CON SU DENTISTA.

Es importante que comprenda que cada niño responde de manera diferente a la sedación oral consciente.

- Para que esta cita tenga éxito, su hijo debe, como mínimo, poder tomar Medicación oral.
- Seguimos estrictas pautas de seguridad con respecto a la cantidad de medicamento que administramos a su hijo, que es en base a su peso. No podemos "dar más medicación" para aumentar el nivel de sedación.
- Para la seguridad de su hijo, no se permite que los padres y visitantes acompañan a su hijo al área de tratamiento
- Su hijo no estará "dormido" y, por lo tanto, se le pedirá que coopere en algún nivel.
- No hay garantía de que su hijo esté lo suficientemente sedado para completar una o todas las actividades planificadas del tratamiento. La opción de sedación más predecible para completar el tratamiento es la anestesia general realizada en un centro de cirugía como The Children 's Hospital, especialmente cuando existe una incapacidad de los niños para cooperar, o necesita un tratamiento extensivo.

Aunque aceptamos la asignación de beneficios de su compañía de seguros para el tratamiento dental real, hay un cargo de \$365 por la sedación que podría no estar cubierto por su seguro. Este pago, así como su copago del seguro será pagado el día de la cita a menos que se hayan hecho arreglos previos. Todos los arreglos financieros deben finalizar antes de la hora de la cita. En caso de que la cita de sedación no tenga éxito, no se cobrará el copago por el tratamiento incompleto y el médico discutirá



sus opciones para completar el tratamiento. La tarifa de \$365 por el procedimiento de sedación se cobrará independientemente de la cantidad de tratamiento completado. Si tiene alguna pregunta después de recibir este paquete, no dude en llamar a nuestra oficina:

Englewood: (303) 779-5306, Central Park: (303) 399-5437, Thornton: (720) 629-9969.

PARENT/ GUARDIAN SIGNATURE: _____

La mayoría de los niños están tranquilos, cómodos y confiados en el dentista pediatra del consultorio. El consultorio está diseñado para gente joven, y los dentistas pediátricos tienen capacitación adicional en el cuidado de infantes, niños y adolescentes. Los miembros del personal eligen trabajar en un consultorio dental pediátrico porque les gustan los niños y quieren atender sus necesidades especiales. Estos elementos combínalos para que su hijo se sienta relajado y especial.

A veces, un niño puede sentirse ansioso antes o durante el tratamiento.

El óxido/oxígeno Nitroso es un agente sedante seguro y eficaz que se utiliza para calmar el miedo de un niño a la visita al dentista y mejora a tener una comunicación más eficaz. Además, funciona bien para los niños cuyo reflejo nauseoso interfiere con el tratamiento dental.

¿Qué es el óxido nitroso/oxígeno?

El óxido nitroso/oxígeno (N₂O-O₂) es una mezcla de dos gases: oxígeno y óxido nitroso.

Se coloca una máscara sobre la nariz y, como el paciente respira normalmente, la captación se produce a través de los pulmones, al final del tratamiento, se elimina después de un corto período de respiración de oxígeno y no tiene efectos persistentes.

¿Cómo se sentirá mi hijo al respirar óxido nitroso/oxígeno?

Su hijo percibirá un aroma suave y dulce y experimentará una sensación de bienestar y relajación. Dado que puede producir una sensación de vértigo o euforia. A menudo a esto se le llama "gas de la risa". Los niños a veces informan que sueñan y que sus brazos y piernas pueden sentir "hormigueo". Eleva el umbral del dolor e incluso puede hacer que el tiempo parezca pasar rápidamente. Si su hijo está preocupado por las vistas, los sonidos o las sensaciones del tratamiento dental, él o ella puede responder de manera más positiva con el uso de óxido nitroso/oxígeno.

¿Qué tan seguro es el óxido nitroso?

Muy seguro. El óxido nitroso/oxígeno es quizás el sedante más seguro en odontología. Es bien tolerado. Tiene un inicio de acción rápido, es reversible y puede ajustarse en varias concentraciones y es no alergénico, su hijo permanece completamente consciente, mantiene todos los reflejos naturales, cuando respira óxido nitroso/oxígeno. Él / ella será capaz de responder a una pregunta o solicitud. El óxido Nitroso/oxígeno también se puede usar en combinación con otros agentes sedantes.

Instrucciones preoperatorias para sedaciones conscientes

Su dentista lo ha considerado necesario y usted ha dado su consentimiento para usar medicamento para sedación oral con su hijo para su próxima visita al dentista. Es muy importante que siga estas instrucciones con mucho cuidado y si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones que le pregunte al dentista o al personal del dentista antes de la cita dental.

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

- No le dé a su hijo NINGÚN medicamento dentro de las 24 horas de la cita de sedación sin discutir previamente la medicación exacta con el dentista que realiza el procedimiento de sedación. ¡¡ESTO INCLUYE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE!!
- Su hijo deberá seguir las pautas NPO recomendadas y NO DEBE COMER O BEBER NADA DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE antes de la hora señalada.



- Si su hijo tiene temperatura elevada (temperatura oral superior a 100.4 grados F) dentro de una semana de la cita programada, llame para informar a la oficina.
- Si su hijo tiene un "resfriado" o cualquier otra enfermedad dentro de una semana de la cita, incluyendo: secreción nasal, tos, dolor de garganta, fiebre, vómitos, diarrea, etc., re programe la cita dental. Es posible que no sea seguro para su hijo recibir medicamentos sedantes si tiene estado enfermo dentro de una semana de la cita.
- El equipo clínico administra el medicamento en la oficina una vez que el paciente ha llegado.

Instrucciones preoperatorias para procedimientos de sedación

Su hijo se ha sometido a un procedimiento de sedación además de un procedimiento dental hoy. Es muy importante que siga unas sencillas instrucciones durante el resto del día de hoy:

- No deje a su hijo solo, ni siquiera por unos momentos, durante las próximas 6 horas. El medicamento que le dieron para la sedación puede seguir siendo eficaz durante las próximas horas. Su hijo debe estar con un ADULTO, si no puede estar con él/ella todo el día de hoy. Vigilar con frecuencia si se queda dormido o toma una siesta. (Especialmente en el automóvil, asegúrese de que la cabeza de su hijo esté colocada de manera que pueda respirar con facilidad).
- Vigile a su hijo por si mastica o se muerde el labio o la lengua. Si se usó un medicamento anestésico hoy el entumecimiento por lo general desaparece en 1 hora, pero es normal si llega a tardar varias horas.
- No permita que su hijo participe en actividades peligrosas o actividades que puedan requerir coordinación (nadar, ciclismo, esquiar, andar en patineta, etcétera.) Hoy su hijo tendrá disminución de coordinación y puede lastimarse a sí mismo.
- Debe alimentar a su hijo con líquidos claros (Gatorade, jugo diluido, agua, paletas heladas, etc.) Si él/ella desea y si tolera los líquidos claros puede adelantar su dieta según la tolere. Su hijo debe comer HASTA que sienta hambre. Sin embargo, su hijo debe beber muchos líquidos hoy. Las cosas frías como helados y paletas de hielo generalmente se sienten bien e hidratan bien a su hijo.
- Puede darle a su hijo acetaminofeno para niños (Tylenol) para el dolor hoy como se indica en el paquete para su edad. Si continúa teniendo dolor, puede darle Ibuprofeno para niños. (Motrin) como se indica en el paquete para su edad. Asegúrese de seguir las instrucciones en el paquete para la frecuencia de administración.

Llame a la oficina por las siguientes razones:

1. Después de 6 horas su hijo aún parece somnoliento y letárgico.
2. Se producen vómitos persistentes, (no es raro que un niño vomite una o dos veces, pero no varias)
3. Su hijo es incapaz de consumir líquidos en las siguientes cuatro horas
4. Su hijo no ha orinado en 6 horas
5. Su hijo tiene una temperatura oral de 101 grados Fahrenheit o más (temperatura debajo del brazo de 100 F o más)
6. Su hijo tiene dolor que no se alivia con los analgésicos mencionados anteriormente
7. Tiene preguntas y/o inquietudes